




Kurs						
Datum/Uhrzeit						
Wetter	gestern			heute		
Bewölkung/Niederschlag	sonnig <input type="checkbox"/>	bewölkt <input type="checkbox"/>	regnerisch <input type="checkbox"/>	sonnig <input type="checkbox"/>	bewölkt <input type="checkbox"/>	regnerisch <input type="checkbox"/>
Temperatur (°C)						

Alle gefundenen Individuen einer Art werden ausgezählt und ihre Häufigkeit im Erhebungsbogen eingetragen (Spalte h) [→S.3]. Danach wird der Saprobienindex berechnet (siehe Auswertebogen).

Gewässer/Probestelle (Bezeichnung, Beschreibung)	Häufigkeit (h)
1	
2	
3	

Schwämme <i>Porifera</i>			
Süßwasserschwämme Fam. <i>Spongillidae</i>			
Muscheln <i>Bivalvia</i>			
Kugelmuschel <i>Sphaerium corneum</i>			
Wandermuschel <i>Dreissena polymorpha</i>			
Gemeine Flussmuschel <i>Unio crassus</i>			
Erbsenmuscheln <i>Pisidium sp.</i>			
Teichmuschel <i>Anodonta cygnea</i>			
Schnecken <i>Gastropoda</i>			
Langfühlige Schnauzenschnecke <i>Bithynia tentaculata</i>			
Quellenschnecke <i>Bythinella sp.</i>			
Spitze Blasenschnecke <i>Physella acuta</i>			
Quellblasenschnecke <i>Physa fontinalis</i>			
Eiförmige Schlamm Schnecke <i>Radix peregra</i>			
Flussnapfschnecke <i>Ancylus fluviatilis</i>			
Teichnapfschnecke <i>Acroloxus lacustris</i>			
Posthornschncke <i>Planorbarius corneus</i>			
Sumpfschnecke <i>Viviparus viviparus</i>			
Flussschwimmschnecke <i>Theodoxus fluviatilis</i>			
Strudelwürmer <i>Turbellaria</i>			
Milchweißer Strudelwurm <i>Dendrocoelum lacteum</i>			
Alpenstrudelwurm <i>Crenobia alpina</i>			
Vielaugenstrudelwurm <i>Polycelis felina</i>			
Schwarzer Strudelwurm <i>Polycelis nigra</i>			
Dreieckskopfstrudelwurm <i>Dugesia gonocephala</i>			
Tigerstrudelwurm <i>Dugesia tigrina</i>			

Trauerstrudelwurm <i>Dugesia lugubris</i>			
Wildblickender Strudelwurm <i>Planaria torva</i>			
Egel <i>Hirundinea</i>			
Zweiäugiger Plattegel <i>Helobdella stagnalis</i>			
Gemeiner Fischegel <i>Piscicola geometra</i>			
Kleiner Schneckenegel <i>Glossiphonia heteroclita</i>			
Großer Schneckenegel <i>Glossiphonia complanata</i>			
Rollegel <i>Eprobdella octoculata</i>			
Pferdeegel <i>Haemopsis sanguisuga</i>			
Fliegen- und Mückenlarven <i>Diptera</i>			
Zuckmückenlarve ohne Tubuli <i>Chironomidae</i>			
Rote Zuckmückenlarve mit Tubuli <i>Chironomus</i> Gruppe			
Kriebelmückenlarve <i>Simulium</i> sp.			
Lidmückenlarve <i>Liponeura</i> sp.			
Schnakenlarve <i>Tipula</i> sp.			
Rattenschwanzlarve <i>Eristalinae</i>			
weitere Fliegenlarven			
Wenigborster <i>Oligochaeta</i>			
Schlammröhrenwurm <i>Tubifex</i> sp.			
Glanzwurm <i>Lumbriculus variegatus</i>			
Krebstiere <i>Crustacea</i>			
Flohkrebs <i>Gammarus pulex</i>			
Flussflohkrebs <i>Gammarus roeseli</i>			
Wasserassel <i>Asellus aquaticus</i>			
Amerikanischer Flusskrebs <i>Orconectes limosus</i>			
Libellenlarven <i>Odonata</i>			
Gewöhnliche Federlibellenlarve <i>Platycnemis pennipes</i>			
<i>Zygoptera</i> (Kleinlibellen)			
Eintagsfliegenlarven <i>Ephemeroptera</i>			
Aderhafte <i>Ecdyonurus</i> sp.			
Zweischwänziger Aderhaft <i>Epeorus sylvicola</i>			
Dänische Eintagsfliege <i>Ephemera danica</i>			
Wimperhafte <i>Caenis</i> sp.			
Glashafte <i>Baëtidae</i> nondet.			
Großer Gelbhaft <i>Potamanthus luteus</i>			
Gabeleintagsfliege <i>Habroleptoides modesta</i>			
Fam. <i>Ephemerellidae</i>			
Gefleckter Aderhaft <i>Rhitrogena semicolorata</i>			
<i>Habroleptoides confusa</i> (schwimmende E.-larven)			
<i>Ephemera</i> spec. (grabende E.-larven)			
Fam. <i>Ephemerellidae</i> (kriechende E.-larven)			

Fam. <i>Baetidae</i> (schwimmende E.-larven)			
<i>Epeorus</i> spec. (flache E.-larven)			
Steinfliegenlarven <i>Plecoptera</i>			
Nadelsteinfliege <i>Leuctra</i> sp.			
Vielkiemige Uferfliege <i>Amphinemura</i> sp.			
Großköpfige Steinfliege <i>Dinocras</i> sp.			
Großer Uferbold <i>Perla marginata</i>			
Schlammfliegenlarven <i>Megaloptera</i>			
Schlammfliege <i>Sialis</i> sp.			
Köcherfliegenlarven <i>Trichoptera</i>			
Wassergeistchen <i>Hydropsyche</i> sp.			
Bergbachköcherfliegenlarven <i>Rhyacophila</i> sp.			
Netzköcherfliegenlarven <i>Polycentropidae</i>			
Blassfüßige Köcherfliegenlarven <i>Silo</i> sp.			
Maskenköcherfliegenlarven <i>Sericostoma</i> sp.			
Vierkantköcherfliegenlarve <i>Lepidostoma hirtum</i>			
Köcherjungferlarven <i>Limnephilidae</i>			
Pilzkopfköcherfliegenlarve <i>Anabolia nervosa</i>			
Käfer, Käferlarven <i>Coleoptera</i>			
Hakenkäferlarve <i>Elmis</i> sp.			
Hakenkäfer <i>Elmis maugetii</i>			
Bachtaumelkäfer <i>Orectochilus villosus</i>			
Gefleckter Schnellschwimmer <i>Platambus maculatus</i>			
Wasserwanzen <i>Heteroptera</i>			
Ruderwanzen <i>Corixa</i> sp.			
Wasserskorpion <i>Nepa rubra</i>			
Stoßwasserläufer <i>Velia caprai</i>			

Die Häufigkeit (h) wird geschätzt und als **Häufigkeitsklasse** eingetragen. Es ist nicht nötig (und manchmal gar unmöglich), alle Individuen zu zählen.

Schätzhäufigkeit	Anzahl	Häufigkeitsklasse h
Einzelfund	1-2	1
wenig	3-10	2
wenig-mittel	11-30	3
mittel	31-60	4
mittel-viel	61-100	5
viel	101-150	6
massenhaft	>150	7